

## EJERCICIOS RESUELTOS DE LOGARITMOS

1. Calcular el valor de  $x$ , aplicando la definición de logaritmo:

a)  $x = \log_4 64$    b)  $x = \log_3 \frac{1}{27}$    c)  $x = \log_3 81$    d)  $x = \log_2 2\sqrt{2}$    e)  $\log_x 125 = -3$    f)  $\log_2(4x) = 3$

### Solución

El logaritmo de un número es el número al que hay que elevar la base para obtenerlo, es decir,

$$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$$

a)  $x = \log_4 64 \Leftrightarrow 4^x = 64$ . Como  $64 = 4^3$ , se tiene  $4^x = 4^3$  y por tanto  $x = 3$ .

b)  $x = \log_3 \frac{1}{27} \Leftrightarrow 3^x = \frac{1}{27}$ . Como  $\frac{1}{27} = 3^{-3}$ , se tiene  $3^x = 3^{-3}$  y por tanto  $x = -3$ .

c)  $x = \log_3 81 \Leftrightarrow 3^x = 81$ . Como  $81 = 3^4$ , se tiene  $3^x = 3^4$  y por tanto  $x = 4$ .

d)  $x = \log_2 2\sqrt{2} \Leftrightarrow 2^x = 2\sqrt{2}$ , Como  $2\sqrt{2} = 2 \cdot 2^{1/2} = 2^{3/2}$ , se tiene  $2^x = 2^{3/2}$  y por tanto  $x = \frac{3}{2}$ .

e)  $\log_x 125 = -3 \Leftrightarrow x^{-3} = 125 \Leftrightarrow \frac{1}{x^3} = 125 \Leftrightarrow \frac{1}{125} = x^3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{5}$

f)  $\log_2(4x) = 3 \Leftrightarrow 2^3 = 4x \Leftrightarrow x = 2$

2. Determinar la parte entera del número  $x = \log_2 11$ .

### Solución

Para determinar la parte entera se buscan las potencias de 2 entre las que se encuentra el número 11, estas son  $2^3$  y  $2^4$ , es decir, se verifica  $2^3 < 11 < 2^4$ .

Tomando logaritmos en base 2 se mantiene la desigualdad, ya que la base es mayor que 1, así  $\log_2 2^3 < \log_2 11 < \log_2 2^4$ , es decir,  $3 < \log_2 11 < 4$ , de donde se deduce que la parte entera de  $\log_2 11$  es igual a 3.

3. Sabiendo que  $\log_{10} 4 = 0,60206$  calcular una aproximación de los siguientes valores:

a)  $\log_{10} 2$    b)  $\log_{10} \frac{1}{4}$    c)  $\log_{10} 0,2$    d)  $\log_{10} 4000$

### Solución

Se aplican propiedades de los logaritmos para escribir los valores en función de  $\log_{10} 4$ .

a)  $\log_{10} 2 = \log_{10} \sqrt{4} = \log_{10} 4^{1/2} = \frac{1}{2} \log_{10} 4 \approx \frac{1}{2} \cdot 0,60206 = 0,30103$

b)  $\log_{10} \frac{1}{4} = \log_{10} 4^{-1} = -\log_{10} 4 \approx -0,60206$

$$\text{c) } \log_{10} 0{,}2 = \log_{10} \frac{2}{10} = \log_{10} 2 - \log_{10} 10 \approx 0{,}30103 - 1 = -0{,}69897$$

$$\text{d) } \log_{10} 4000 = \log_{10} (4 \cdot 1000) = \log_{10} 4 + \log_{10} 1000 = \log_{10} 4 + \log_{10} 10^3 \approx 0{,}60206 + 3 = 3{,}60206$$

4. Conocidos  $\ln a = 0{,}6$  y  $\ln b = 2{,}4$  calcular:

$$\text{a) } \ln \sqrt{a} \quad \text{b) } \ln \sqrt[4]{b} \quad \text{c) } \ln \sqrt{ab} \quad \text{d) } \ln \sqrt[3]{\frac{ab}{e^2}} \quad \text{e) } \ln \frac{\sqrt{a^{-3}}}{\sqrt[3]{b^2}}$$

**Solución**

$$\text{a) } \ln \sqrt{a} = \ln a^{1/2} = \frac{1}{2} \ln a = \frac{1}{2} \cdot 0{,}6 = 0{,}3$$

$$\text{b) } \ln \sqrt[4]{b} = \ln b^{1/4} = \frac{1}{4} \ln b = \frac{1}{4} \cdot 2{,}4 = 0{,}6$$

$$\text{c) } \ln \sqrt{ab} = \ln (ab)^{1/2} = \frac{1}{2} \ln(ab) = \frac{1}{2} (\ln a + \ln b) = \frac{1}{2} (0{,}6 + 2{,}4) = \frac{1}{2} \cdot 3 = 1{,}5$$

$$\text{d) } \ln \sqrt[3]{\frac{ab}{e^2}} = \ln \left( \frac{ab}{e^2} \right)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln \frac{ab}{e^2} = \frac{1}{3} (\ln(ab) - \ln e^2) = \frac{1}{3} (\ln a + \ln b - 2) = \frac{1}{3} (0{,}6 + 2{,}4 - 2) = \frac{1}{3}$$

$$\text{e) } \ln \frac{\sqrt{a^{-3}}}{\sqrt[3]{b^2}} = \ln \sqrt{a^{-3}} - \ln \sqrt[3]{b^2} = \ln a^{-3/2} - \ln b^{2/3} = -\frac{3}{2} \ln a - \frac{2}{3} \ln b = -\frac{3}{2} \cdot 0{,}6 - \frac{2}{3} \cdot 2{,}4 = -2{,}5$$

5. Sabiendo que  $\log_{10} 3 \approx 0{,}4771$  resolver las siguientes ecuaciones:

$$\text{a) } 10^{x+4} = 30 \quad \text{b) } \log_{10} 0{,}03 = x - 1$$

**Solución**

a) Para despejar  $x$  de la ecuación  $10^{x+4} = 30$ , se toman logaritmos decimales en ambos miembros de la ecuación, quedando  $x + 4 = \log_{10} 30$ , de donde se tiene:

$$x = -4 + \log_{10} 30 = -4 + \log_{10} (3 \cdot 10) = -4 + \log_{10} 3 + \log_{10} 10 \approx -4 + 0{,}4771 + 1 = -2{,}5229$$

b) Despejando  $x$  de la ecuación  $\log_{10} 0{,}03 = x - 1$  y realizando operaciones, se obtiene:

$$\begin{aligned} x &= 1 + \log_{10} 0{,}03 = 1 + \log_{10} \frac{3}{100} = 1 + \log_{10} 3 - \log_{10} 100 = \\ &= 1 + 0{,}4771 - \log_{10} 10^2 \approx 1{,}4771 - 2 = -0{,}5229 \end{aligned}$$

6. Resolver las siguientes ecuaciones: a)  $e^{x+2} = \sqrt{e}$  b)  $\log_{10} 16 - 2 \log_{10} x = \log_{10} 100$

**Solución**

a) La ecuación  $e^{x+2} = \sqrt{e}$  se puede escribir  $e^{x+2} = e^{1/2}$ . Para despejar  $x$  se toman logaritmos neperianos en ambos miembros, quedando  $x + 2 = \frac{1}{2}$ , de donde  $x = -2 + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$

b) Aplicando propiedades de los logaritmos en el primer miembro de  $\log_{10} 16 - 2\log_{10} x = \log_{10} 100$  se obtiene:

$$\log_{10} 16 - 2\log_{10} x = \log_{10} 16 - \log_{10} x^2 = \log_{10} \frac{16}{x^2}$$

Por tanto, la ecuación queda  $\log_{10} \frac{16}{x^2} = \log_{10} 100$ , de donde  $\frac{16}{x^2} = 100$ , es decir,  $\frac{16}{100} = x^2$ , cuyas soluciones son  $x = \pm \frac{2}{5}$ .

El valor  $x = -\frac{2}{5}$  no es solución de la ecuación inicial, ya que no existe el logaritmo de un número negativo, por tanto, la única solución es  $x = \frac{2}{5}$ .